

## COMUNICADO DE PRENSA

# **SOCIEDAD ANDALUZA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA (ALERGOSUR) SOBRE EL FALLECIMIENTO POR PICADURA DE AVISPA EN GRANADA**

En relación al fallecimiento de una persona por picadura de avispa el pasado lunes en Montillana (Granada), la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (ALERGOSUR) desea ante todo dar su más sentido pésame a los familiares y allegados y comunica:

- La picadura de himenópteros (avispas y abejas) produce en la gran mayoría de los casos reacciones locales leves que no requieren tratamiento. Solo un 3% de la población puede sufrir una reacción alérgica grave que ponga en peligro la vida por el veneno de estos insectos.
- Es imprescindible que cualquier persona que sufra una reacción generalizada o una reacción local extensa (mayor de 10 cm) con la picadura de estos insectos, sea evaluado por un alergólogo lo antes posible, ya que es el especialista cualificado para diagnosticar y tratar la hipersensibilidad o alergia al veneno de himenópteros.
- Todo paciente diagnosticado de alergia a veneno de avispas y abejas y con reacciones generalizadas, debe llevar consigo adrenalina, preferentemente en forma de autoinyectores y estar instruido en su autoadministración.
- La alergia al veneno de himenópteros tiene tratamiento con inmunoterapia (vacuna) que se administran en ámbito hospitalario y que tienen una efectividad mayor al 90% de los casos.
- En Andalucía, no tenemos *Vespa velutina* (avispa asiática) responsable de fallecimientos en Galicia recientemente. Los himenópteros responsables de reacciones alérgicas en nuestra comunidad son el *Polistes dominula* (tabarro, avispa papelera), *Véspula germánica* (terrizo) y *Apis mellifera* (abeja de la miel). Hay otros himenópteros que también pueden producir reacciones alérgicas como *Vespa crabro* (avispón) y *Bombus terrestris* (abejorro), utilizado como polinizador en los invernaderos (sobre todo de tomates) de nuestra comunidad.
- Por último, la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (ALERGOSUR) quiere recalcar que, al menos, un tercio de los pacientes que han presentado reacción alérgica generalizada no son derivados al alergólogo desde Atención Primaria, Servicio de Urgencias u otros facultativos que atienden inicialmente a estos pacientes, como se puso de manifiesto en una encuesta realizada hace unos años.